**R4P • Réseau Régional de Rééducation
et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes**

Introduction

Histoire de l'évaluation, intérêt pour la famille, le patient

***Carole Vuillerot, Pédiatre,
Service l'Escale, Hôpital Femme Mère Enfant, Bron***

un jugement de valeur sur
une entreprise

Si vous deviez représenter par une image ce
que signifie pour vous *évaluer*, quelle
serait-elle?

Genèse de la nécessité d'évaluer en médecine

- Evidence des progrès de la médecine depuis la 2nd guerre mondiale avec les grandes découvertes
- Puis la notion de qualité s'impose de façon concomitante à l'augmentation du coût de la santé avec la nécessaire **évaluation du rapport coût/efficacité des soins**
- Evolution de la relation médecin/malade d'une relation paternaliste vers la décision médicale partagée **évaluation des besoins des patients dans toutes les dimensions de sa vie**
- Le paradigme de l'«Evidence Based Medicine». La médecine n'est plus seulement un art, elle doit se fonder sur les meilleures données cliniques externes **évaluation critique de la validité et de l'utilité des résultats**

Le médecin se trouvent confronté à une contrainte externe (augmentation des dépenses de santé) et une contrainte interne (inflation des connaissances)

1. L'évaluation comme solution pour affronter ces 2 obstacles
2. L'évaluation comme un outils de transparence vis-à-vis du patient et des tutelles

Une tentative de définition du mot «évaluation »...

- Evaluer c'est apprécier objectivement l'efficacité de telle ou telle stratégie pour permettre un meilleure choix pour le malade. C'est mettre en place les procédures permettant d'en vérifier la bonne réalisation, détecter et quantifier les écarts, imaginer et fournir les éléments pour mettre en place les éléments de corrections

Yves Matillon Rev Prat 1982

Finalité de l'évaluation

L'évaluation n'a pas d'autre finalité que celle de mieux soigner les malades et d'améliorer la qualité des soins

Evolution des cibles de l'évaluation dans le champ du handicap

Mais aussi du type de mesures

- Des mesures dites objectives

- Esperance de vie
- Timed test

Vers les mesures centrees sur le patient

- Mesures ecologiques
- Mesures subjectives s'interessant au ressenti du patient
 - QdV
 - Douleur
 - Echelle de contrats d'objectifs : GAS, COPRM

Pour faire une bonne mesure encore faut il avoir un bon outil

- Un outil fiable qui donne les mêmes résultats d'une mesure chez un patient considéré comme « stable » si ce test ou cette prise de mesure est répétée ou lorsqu'elle est effectuée par des testeurs différents [Streiner & Norman, 2003]
- Un outil valide qui mesure bien ce qu'il prétend mesurer [Bruchon-Schweitzer]
- Un outil sensible au changement qui est capable de mesurer avec précision les variations en plus ou en moins du phénomène mesuré. Il doit permettre un classement suffisamment fin des individus et être capable de repérer des variations cliniquement perceptibles [de Vet 2006]
- Un outil applicable facilement

Quels intérêts de la mesure pour le patient et sa famille ?

Une meilleure connaissance de la maladie et de son evolution : Les etudes d'histoire naturelle

Les données de la littérature
La DMD est une maladie progressive

T. XXII - n° 1 - 1979 ANNALES DE MÉDECINE PHYSIQUE

5

FIGURE 3
Evolution probable d'un enfant de 10 ans ayant un score de testage global à 52 % de la normale.

Legrand-Persoz M, Persoz B, Boulvert E, Gros P, Dardel JP, Arhan P. Surveillance de l'évolution musculaire respiratoire dans la myopathie de Duchenne de Boulogne à évolution rapide: application au contrôle thérapeutique. *Ann Med Phys* 1979; **23**: 1-14.

La DMD est une maladie progressive

Allsop KG, Ziter FA. Loss of strength and functional decline in Duchenne's dystrophy. Arch Neurol 1981; **38**: 406–11.

Fig 5.—Timed 750-cm walk. Top, Patients who remained capable of task. Bottom, Patients who failed task.

Fig 6.—Composite functional decline in group.

La DMD est une maladie progressive

Brooke MH, Fenichel GM, Griggs RC, Mendell JR, Moxley R, Miller JP, Province MA. *Clinical investigation in Duchenne dystrophy. 2. Determination of the 'power' of therapeutic trials based on the natural history. Muscle Nerve* 1983; **6**: 91–103.

Figure 4. These plots are of the strength of 23 of the patients during the course of the protocol. The average muscle score of each patient is plotted against the age of the patient. The points for an individual patient are joined.

Figure 1. A scatter plot of the average muscle score versus the age of the patient at the time the observation was made. ($R = 0.47$; $P < 0.0001$)

Figure 9. The functional grade of patients plotted against their age.

Modification de l'histoire naturelle des pathologies

Moyenne du Score Total MFM pour 27 DMD (vs âge) avant traitement par corticoïdes

Moyenne du Score Total MFM pour 27 DMD après 2-3 ans de traitement par corticoïdes

Identifier un évènement intercurrent afin de proposer une intervention thérapeutique

EMFG de Piel K. né le 17/06/94

Préparer une étape importante comme la perte de la marche

DEVELOPMENTAL MEDICINE & CHILD NEUROLOGY

ORIGINAL ARTICLE

Monitoring changes and predicting loss of ambulation in Duchenne muscular dystrophy with the Motor Function Measure

CAROLE VUILLEROT MD^{1,2} | FRANÇOISE GIRARDOT PT^{1,2} | CHRISTINE PAYAN MD³ | JACQUES FERMANIAN PHD⁴ | JEAN IWAZ PHD^{5,6,7,8} | CAPUCINE DE LATTRE MD^{1,2} | CAROLE BERARD MD^{1,2}

Dimension D1

Total Score

En utilisant le changement moyen des scores MFM sur 1 an chez les patients marchants, une estimation des scores MFM 1 an avant la perte de marche a pu être proposée : **MFM D1 50%** et **MFM TS 75%**

Espérer pouvoir identifier l'efficacité éventuelle d'une thérapeutique

TRO19622CLEQ1275-1

Phase II, multicentre, randomised, adaptive, double-blind, placebo controlled study to assess safety and efficacy of olesoxime (19622) in 3-25 year old Spinal Muscular Atrophy (SMA) patients

STUDY DESIGN

Espérer pouvoir identifier l'efficacité éventuelle d'une thérapeutique

Espérer pouvoir identifier l'efficacité éventuelle d'une thérapeutique

PRIMARY ENDPOINT - MFM D1+D2 (FAS, DERIVED DATA)

- The treatment effect at M24 is close to significance but not significant (primary analysis: $p = 0.066$)
- The overall treatment effect over time (main treatment effect) is highly significant (main secondary analysis: $p = 0.0084$).

Conclusions

- La mesure plus que l' évaluation
- Intérêt partagé pour le patient et le professionnel
- Des preuves sont maintenant « exigées » pour justifier le choix de tel ou tel traitement, tout en tenant compte des préférences du patient
- La mesure est nécessaire en médecine avant tout car l'humain mérite rigueur

Merci de votre attention

carole.vuillerot@chu-lyon.fr

Colloque R4P –21 mai 2014